



TOKUSHUKAI

乳癌 補助化学療法

AC

共通コード

750022

区分: 化学療法 補助療法 カテゴリー Ib	適応: 20-75歳 PS 0-2	催吐リスク: 高 発熱性好中球減少リスク: 中 起壊死性抗癌剤
------------------------------	----------------------	---------------------------------------

使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	シクロホスファミド	CPA	600mg/m ²	点滴静注	30分	day 1	あり
2	アドリアマイシン	ADM	60mg/m ²	点滴静注	5分	day 1	あり
1コース期間 (次のコースまでの標準期間)		21日(3週)	総コース数	4コース			



TOKUSHUKAI

乳癌 補助化学療法

AC-weekly PAC (wPAC)

共通コード

750112

区分: 化学療法 補助療法 カテゴリー Ia	適応: 20-75歳 PS 0-2	催吐リスク: 低 発熱性好中球減少リスク: 低
------------------------------	----------------------	----------------------------

使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	パクリタキセル	PAC	80mg/m ²	点滴静注	60分	day 1,8,15...	あり
1コース期間 (次のコースまでの標準期間)		7日(1週)	総コース数	AC 4コース→weekly PAC 12回			



TOKUSHUKAI

乳癌 補助化学療法


EC


共通コード


750032


区分: 化学療法 補助療法 カテゴリー Ib	適応: 20-75歳 PS 0-2	催吐リスク: 高 発熱性好中球減少リスク: 中 起壊死性抗癌剤
------------------------------	----------------------	---------------------------------------


使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	シクロホスファミド	CPA	600mg/m ²	点滴静注	30分	day 1	あり
2	エピルビシン	EPI	90mg/m ²	点滴静注	5分	day 1	あり
1コース期間 (次のコースまでの標準期間)		21日(3週)	総コース数	4コース			


 TOKUSHUKAI		乳癌 化学療法 3w PAC				共通コード 750004	
区分: 化学療法 補助療法 カテゴリー Ia		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 低 発熱性好中球減少リスク: 中			
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	パクリタキセル	PAC	175mg/m ²	点滴静注	3時間	day 1	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		21日(3週)		総コース数		4コース	


 TOKUSHUKAI		乳癌 補助化学療法 TC				共通コード 750062	
区分: 化学療法 補助療法 カテゴリー Ib		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 中 発熱性好中球減少リスク: 中			
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	シクロホスファミド	CPA	600mg/m ²	点滴静注	30分	day 1	あり
2	ドセタキセル	DOC	75mg/m ²	点滴静注	60分	day 1	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		21日(3週)		総コース数		4コース	


 TOKUSHUKAI		乳癌 補助化学療法 FEC 100				共通コード 750052	
区分: 化学療法 補助療法 カテゴリー Ib		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 高 発熱性好中球減少リスク: 中 起壊死性抗癌剤			
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	シクロホスファミド	CPA	500mg/m ²	点滴静注	30分	day 1	あり
2	エピルビシン	EPI	100mg/m ²	点滴静注	5分	day 1	あり
3	フルオロウラシル	5FU	500mg/m ²	点滴静注	30分	day 1	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		21日(3週)		総コース数		6コース	


 TOKUSHUKAI		乳癌 補助化学療法 classical CMF				共通コード 75001	
		区分: 化学療法 補助療法 カテゴリー Ib		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 中 発熱性好中球減少リスク: 中	
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	シクロホスファミド	CPA	100mg/m ²	内服	1日1回	day1-14	あり
2	メトトレキサート	MTX	40mg/m ²	点滴静注	20分	day1,8	あり
3	フルオロウラシル	5-FU	600mg/m ²	点滴静注	20分	day1,8	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		28日(4週)		総コース数		6コース	



 TOKUSHUKAI		乳癌 補助化学療法 iv CMF				共通コード 750012	
		区分: 化学療法 補助療法 カテゴリー Ib		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 中 発熱性好中球減少リスク: 中	
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	シクロホスファミド	CPA	600mg/m ²	点滴静注	30分	day 1	あり
2	メトトレキサート	MTX	40mg/m ²	点滴静注	30分	day 1	あり
3	フルオロウラシル	5-FU	600mg/m ²	点滴静注	30分	day 1	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		21日(3週)		総コース数		6コース	

 TOKUSHUKAI		乳癌 補助化学療法 3w Trastuzumab				共通コード 750072	
		区分: 化学療法 補助療法 カテゴリー Ia		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 最小 発熱性好中球減少リスク: 低	
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	トラスツマブ(初回)	HER	8mg/kg	点滴静注	90分	day 1	あり
	トラスツマブ(2回目以降)		6mg/kg	点滴静注	30分	day 1	
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		21日(3週)		総コース数		1年間	

 TOKUSHUKAI		乳癌 補助療法 weekly PAC+HER				共通コード 750301	
		区分: 化学療法 補助療法 カテゴリー Ib		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 発熱性好中球減少リスク:	
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	パクリタキセル	PAC	80mg/m ²	点滴静注	60分	day1,8,15...	あり
2	トラスツズマブ(初回)	HER	4mg/kg	点滴静注	90分	day1	あり
3	トラスツズマブ(2回目以降)		2mg/kg	点滴静注	30分	day8,15...	あり
4							
5							
6							
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		7日(1週)		総コース数		12回	

 TOKUSHUKAI		乳癌 化学療法 3w PAC+3w Trastuzumab				共通コード 750005	
		区分: 化学療法 補助療法 カテゴリー Ib		適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 低 発熱性好中球減少リスク: 中	
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	パクリタキセル	PAC	175mg/m ²	点滴静注	3時間	day 1	あり
2	トラスツズマブ(初回)	HER	8mg/kg	点滴静注	90分	day 1	あり
	トラスツズマブ(2回目以降)		6mg/kg	点滴静注	30分	day 1	
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		21日(3週)		総コース数		4コース	

 TOKUSHUKAI		乳癌 化学療法 Per+Tra+weeklyPAC				共通コード 750019	
		区分: 化学療法 補助療法 カテゴリー Ib		適応: 年齢 20-75歳 PS 0-1		催吐リスク: 低 発熱性好中球減少リスク: 低	
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	ペルツズマブ(初回)		840mg/body	点滴静注	60分	day 1	あり
	ペルツズマブ(2回目以降)		420mg/body	点滴静注	30分	day 1	
2	トラスツズマブ(初回)		8mg/kg	点滴静注	90分	day 1	あり
	トラスツズマブ(2回目以降)		6mg/kg	点滴静注	30分	day 1	
3	パクリタキセル	PAC	80mg/m ²	点滴静注	60分	day 1.8.15	あり
1コース期間 <small>(次のコースまでの標準期間)</small>		21日(3週)		総コース数		4コース	

 TOKUSHUKAI		乳癌 化学療法				共通コード 750021	
		Pertuzumab+Trastuzumab					
区分:	化学療法 補助療法 カテゴリー Ib	適応: 年齢 PS 0-1	20-75歳	催吐リスク 発熱性好中球減少リスク:	最小 低		
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	ペルツズマブ(初回)		840mg/body	点滴静注	60分	day 1	あり
	ペルツズマブ(2回目以降)		420mg/body	点滴静注	30分	day 1	
2	トラスツズマブ(初回)		8mg/kg	点滴静注	90分	day 1	あり
	トラスツズマブ(2回目以降)		6mg/kg	点滴静注	30分	day 1	
3							
4							
1コース期間 (次のコースまでの標準期間)		21日(3週)		総コース数	1年(化学療法との併用を含めて)		
 TOKUSHUKAI		乳癌 補助化学療法				共通コード 750003	
		TCH					
区分:	化学療法 補助療法 カテゴリー Ib	適応: 20-75歳 PS 0-2		催吐リスク: 発熱性好中球減少リスク:	中 中		
使用薬剤							
番号	抗癌剤名	略号	1日投与量	投与方法	投与時間	投与日	保険適応
1	ドセタキセル	DOC	75mg/m ²	点滴静注	60分	day1	あり
2	カルボプラチン	CBDCA	AUC 6	点滴静注	30分	day1	あり
3	トラスツズマブ(初回)	HER	4mg/kg	点滴静注	90分	day1	あり
	トラスツズマブ(2回目以降)		2mg/kg	点滴静注	30分	day 1,8,15	
1コース期間 (次のコースまでの標準期間)		21日(3週)		総コース数	6コース→3w HER 34週間		